

Analiza terapii astmy

ANALIZA DLA FIRMY ASTRAZENECA


Październik 2018

pex PharmaSequence

Roczne zużycie SABA

Pacjenci stosujący SABA bez WGKS i LABA stosują średnio 6.5 opakowań preparatów SABA rocznie.

Rozkład i średnie zużycie preparatów SABA przez pacjenta w segmencie. Segmentacja nie uwzględnia stosowania SAMA, LAMA i LTRA
% pacjentów w segmencie / Średnia liczba opakowań rocznie



ANALIZOWANA PRÓBA

- Pacjenci do 64 r.ż.
- Pacjenci regularnie obserwowani w panelu w MAT 06/2018 (we wszystkich 4 kwartałach)
- Pacjenci, którzy w **MAT 06/2018** stosowali **SABA**
- Pacjenci, którzy stosowali preparaty z analizowanych klas R03 w każdym półroczu MAT 06/2018
- Z wyłączeniem pacjentów stosujących LABA i LAMA w min. jednym z kwartałów MAT 06/2018
- **Analiza obejmuje wszystkie preparaty zastosowane w MAT 06/2018**
- **N = 25 394**

Źródło: Analiza danych receptowych - panel RECEPTometr PEX; Informacje o środowisku lekarzy opracowane zostały na podstawie bazy HDM Polska sp. z o.o. / www.hdm.pl/ Grupa FarmaProm.

Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych. Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga podania jako autora PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

