

Prevenar coverage tracker

INFORMACJA Z BADANIA RYNKOWEGO

23 kwietnia 2018

pex PharmaSequence

Poziom wszczepialności przeciwko pneumokokom, wśród dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2017 roku, kształtuje się w Polsce na poziomie 74%, spośród tego 75% jest szczepionych szczepionką bezpłatną, a 24% rodziców decyduje się na szczepionkę płatną PCV13*.



Oznacza to, że tylko 55% rodziców dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2017 roku skorzystało z bezpłatnej szczepionki, a 18% kupiło szczepionkę PCV13.

**w 2% przypadków brak danych w badaniu dotyczących marki szczepionki*

Źródło: Prevenar Coverage & Compliance in Poland, PEX PharmaSequence; Badanie przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2017 roku, na próbie matek dzieci w wieku 7-24 miesięcy, reprezentatywnej ze względu na miejsce zamieszkania i poziom wykształcenia matki. Wielkość próby n=803. Podane wartości procentowe zostały zaokrąglone do liczb całkowitych.

Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich korzystających z dokumentu, na jakiegokolwiek podstawie prawnej, w szczególności za działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim zawartych. Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga podania jako autora PEX PharmaSequence Sp. z o.o.

